

Az alábbi táblázatban összehasonlítjuk a leggyakrabban használt tesztípusokat:

	RT-PCR	Antigén gyorseszteszt (Ag teszt)	Ellenanyag (antitest) gyorseszteszt (IgG/IgM teszt)
Mit mutat ki?	A SARS-CoV-2 (az új koronavírus) örökítőanyagát	A SARS-CoV-2 valamely fehérjéjét (amelyet az immunrendszer felismer)	A szervezet a SARS-CoV-2 ellen termelt antitestjeit
Honnan vesznek mintát?	Orrgarat-, illetve szájgaratnyálkahártyából	Orrgarat-, illetve szájgaratnyálkahártyából	Vérből (ujjbegyéből vagy vénából)
Mennyi ideig tart?	Több mint 2 óra	15–30 perc	15 perc
Szükség van-e további eszközökre, anyagokra?	Igen	Nem	Nem
Ki tudja-e mutatni a fertőzést a tünetek megjelenését követő...			
...első héten?	Igen	Igen	Általában nem
...második héten?	Igen	Általában nem	Többnyire igen
...harmadik és negyedik héten?	Esetenként igen	Nem	Igen
Kimutatja-e a múltban lezajlott fertőzést?	Nem	Nem	Igen (ha az ellenanyag még jelen van)